

# LOXAPAC® - loxapine

La Rédaction

**La loxapine est un neuroleptique polyvalent, chef de file de la classe des dibenzo-oxazépines.**

## PROPRIÉTÉS

### PHARMACOLOGIQUES :

Ce médicament se révèle doué d'activité antipsychotique au cours d'essais thérapeutiques dans les psychoses aiguës et chroniques <sup>(1)</sup>. Il réduit les hallucinations et le délire, améliorant la cohérence de la pensée. Posédant, en outre, un effet sédatif, il intéresse particulièrement les médecins des urgences.

## PROPRIÉTÉS

### PHARMACOCINÉTIQUES :

Le pic plasmatique est atteint 1h30 après administration. L'effet sédatif de Loxapac® apparaît en 15 à 30 minutes après injection IM. Après une absorption digestive, il existe un premier captage hépatique qui transforme la loxapine en métabolites eux aussi actifs. La demi-vie est de 8 heures, avec une élimination à 70% rénale.

## EFFETS SECONDAIRES :

Le risque de syndrome malin des neuroleptiques est à évaluer lors de toute utilisation de neuroleptique. Les signes en sont l'hyperthermie, la rigidité musculaire, et les troubles du rythme cardiaque.

Peuvent être notés une hypotension orthostatique, quelques effets atropiniques, comme la rétention d'urine, des dyskinésies précoces. L'apparition d'un rash cutané est exceptionnelle.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Lors d'un traitement chronique, l'absorption d'alcool est déconseillée. Le risque d'altération de la vigilance peut être majeur.

Les sujets âgés, ou sous traitement anti-hypertenseur, peuvent plus fréquemment présenter une hypotension orthostatique. Des précautions particulières sont préconisées en cas d'affections cardiovasculaires, hépatiques, rénales, chez le sujet épileptique et chez les sujets parkinsoniens.

## CONTRE-INDICATIONS :

Il n'existe pas d'A.M.M. pour les enfants de moins de 15 ans. Il ne faut pas prescrire en cas de rétinopathie. Il en est de même pour tout patient déjà traité par des agonistes dopaminergiques. La loxapine ne doit pas être prescrite en cas de coma éthylique ou causé par certains barbituriques.



## INDICATIONS :

Loxapac® est indiqué dans les états psychotiques aigus et chroniques. Il est aussi particulièrement efficace pour réduire un état d'agitation ou calmer un patient agressif.

## PRÉSENTATION :

### Formes orales :

Comprimés de 25, 50 mg, ou 100 mg, et solution buvable à 25mg/ml.

**Forme injectable :** Ampoule de 50 mg/2 ml pour injection IM.

## POSOLOGIE :

L'administration orale est évaluée en fonction de la sensibilité du sujet est varie de 75 à 200 mg/j en 1 à 2 prises. L'administration parentérale est réservée à un usage en urgence. Une à six ampoules (soit 50 à 300 mg), non diluées, seront injectées en 2 à 3 injections en IM profond. ■

La Rédaction

Nous contacter :

<http://www.eisai.fr>

(1). Selman F.B., et al. Loxapine succinate : essai comparatif en double aveugle avec l'halopéridol dans les psychoses aiguës. *Psychologie médicale*, 1979, 11, 7 : 1533-1540.